

Idade	Vacinas	Dose	Proteção para
Ao nascer	BCG	Única dose	As formas graves de tuberculose
	Anti Hepatite B	1ª dose	Hepatite B
<b>OBS: Se mãe for HBsAg+: administrar vacina nas primeiras 12 horas de vida e imunoglobulina humana(HBIG) o mais precocemente possível (até sete dias após o parto)</b>			
2º mes *1	Hexavalente:	1ª dose	Difteria ,tétano,coqueluche, Haemophilus influenzae b,poliomielite, hepatite B
	Anti Rotavirus pentavalente	1ª dose	Doença diarreica
	Pneumocócica conjugada VPC13	1ª dose	Pneumonia, meningite, otite em crianças, causadas por 13 sorotipos de pneumococos.
<b>OBS: Se a criança cuspir, regurgitar ou vomitar após a vacinação, para rotavirus não deve ser repetida a dose.</b>			
3º mês	Meningocócica B Recombinante	1ª dose	Formas graves de meningite B.
	<b>OBS: Crianças que iniciam nesta idade deverão fazer 3 doses e 1 reforço (aos 3,5,7 meses e reforço entre 13 e 15 meses.).</b>		
	Meningocócicas conjugadas ACWY – CRM	1ª dose	Meningite contra as bactérias sorotipos A, C, W, Y.
<b>OBS: Crianças que iniciam nesta idade deverão fazer 3 doses (3 – 5 – 7 meses) . 1º reforço entre 12 e 15 meses e reforços aos 5 anos e aos 11 anos de idade</b>			
4º mês	Hexavalente	2ª dose	
	Rotavirus pentavalente	2ª dose	
	Pneumocócica conjugada VPC13	2ª dose	
5º mês	Meningocócica B	2ª dose	
	Meningocócicas conjugadas ACWY – CRM	2ª dose	
<b>OBS: Crianças vacinadas com Men C se beneficiam com o uso de uma dose da vacina Men ACWY, com o objetivo de ampliar a proteção. Respeitar intervalo mínimo de dois meses da última Men C.</b>			
6º mês	Hexavalente	3ª dose	
	Rotavirus pentavalente	3ª dose	
	Pneumocócica conjugada VPC13	3ª dose	
	Influenza (gripe) quadrivalente	Nos períodos de campanha	
<b>OBS: Quando administrada pela primeira vez em crianças menores de 9 anos, aplicar duas doses com intervalo de 30 dias.</b>			
7º mês	Meningocócica B Recombinante	3ª dose	
	<b>OBS: Se criança receber pela 1ª vez nesta idade e até 11 meses deverá receber 2 doses com intervalo de 2 meses e 1 dose de reforço no 2º ano de vida respeitando-se um intervalo mínimo de dois meses da última dose.</b>		
	Meningocócicas conjugadas ACWY – CRM	3ª dose	
9º meses	Febre amarela	Dose única	
<b>OBS: Em caso de epidemia poderá ser antecipada para crianças de 6 meses.</b>			
12 meses	Hepatite A	1ª dose	Hepatite A
	<b>OBS: Se até os 12 meses criança não recebeu vacina hepatite B no primeiro ano de vida, poderá receber a vacina combinada hepatites A e B na formulação adulto com esquema de duas doses (0 - 6 meses).</b>		
	Tríplice viral	1ª dose	Sarampo, caxumba e rubéola (SRC).
	Varicela	1ª dose	Varicela(V) ou catapora
	<b>OBS: Em casos de surto de varicela ou exposição domiciliar – a 1ª dose pode ser aplicada a partir de 9 meses de idade. Então deverá ser aplicada mais 2 doses após a idade de 1 ano</b>		
	*Quadrupla viral (SRCV) Substitui a tríplice viral e varicela	1ª dose	Sarampo, caxumba, rubéola e varicela

12 a 15 meses	Meningocócica B Recombinante	Reforço	
	<b>OBS: Se criança receber a 1ª dose após os 12 meses de idade deverá receber duas doses com intervalo de dois meses.</b>		
	Meningocócicas conjugadas ACWY – CRM	1º Reforço	
	<b>OBS: Crianças vacinadas com Men C beneficiam-se com o uso de 1 dose da vacina Men ACWY, com o objetivo de ampliar a proteção. Respeitar intervalo mínimo de dois meses da última Men C.</b>		
15 meses	Tríplice viral ou quádrupla viral,	2ª dose	Sarampo rubéola , caxumba e varicela .
	<b>OBS: Preferencialmente com vacina quádrupla viral ou Triviral + Varicela.</b>		
Entre 15 e 18 meses	Pentavalente	Reforço	Difteria, tétano, coqueluche, Haemophilus influenzae B, poliomielite
18 meses	Anti hepatite A	2ª dose	
4 a 5 anos de idade	DTPa ou dTpa-VIP	2º Reforço	
5 anos	Meningocócicas conjugadas ACWY – CRM	2º Reforço	
5 a 6 anos	MenACWY Meningocócicas conjugadas	3º Reforço	
9 anos	Vacina quadrivalente HPV4	1ª dose	Contra os tipos 6,11,16 e 18 Papilomavírus humano.
	<b>OBS: Papilomavírus humano fazer 3 doses 0, 2 e 6 meses.</b>		
Entre 9 e 10 anos	dTpa	3º reforço	
Maiores de 9 anos	DENGUE	1ª dose	
11 anos	Meningocócicas conjugadas ACWY – CRM	4º Reforço	

## Vacinas da criança 0 a 10 anos calendário adotado é o recomendado pela SBP e SBIm

Este calendário é o adotado e recomendada para acompanhar clientela visando maior proteção individual.

Fonte de consulta sobre calendários recomendadas por PNI, SBP e SBIM acessar:

<https://sbim.org.br/images/calendarios/calend-sbim-crianca.pdf>

<http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/vacinacao/calendario-nacional-de-vacinacao>

<http://www.sbp.com.br/departamentos-cientificos/imunizacoes>